

ВИДИ ТВАРИН І РОСЛИН, ЩО ЗНИКЛИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



ВИДИ ТВАРИН, ЩО ЗНИКЛИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


хоча раніше були поширеними тут

ВИДАВНИЦТВО
РАНОК



Росомаха звичайна (*Gulo gulo* L.) - це **лютий хижак** із родини куницевих, через що його завжди переслідували. До кінця XIX століття його можна було зустріти на Поділлі, Черкащині та Житомирщині, але через переслідування він там зник. Зараз цей вид можна знайти в Канаді, Китаї, Естонії, Фінляндії, Монголії, Норвегії, Швеції та США. Останню відому дику особину застрелили **в 1880 році поблизу Канева**.

Кінь дикий, тарпан (*Equus caballus ferrus*) - ймовірний пращур **свійського коня**, колись жив у степах Європи та Азії. Останнього дикого тарпана відловили в 1886 році біля села Нововоронцовка на Херсонщині. **У 1918 році останній тарпан помер** у маєтку поблизу Миргорода на Полтавщині. **Вимерлий вид**.



Соболь (*Martes zibellina* L.) – це ссавець з родини куницевих, який зазвичай живе в тайзі. Зараз соболі мешкають у лісах від Печори до Тихого океану. У минулому вони жили набагато далі на захід, **включаючи північну частину України**. Останні згадки про соболів в Україні датуються **XVI століттям**.

ВИДИ ТВАРИН, ЩО ЗНИКЛИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


хоча раніше були поширеними тут

ВИДАВНИЦТВО
РАНОК



Кулан (Equus hemionus), або азійський дикий віслик, належить до родини коневих. Він зовні дуже схожий на африканського віслика, але має багато спільного з конем, тому його часто називають напіввісликом. Кулан ніколи не був приручений, на відміну від звичайного віслика. Він **зник з території України приблизно у XVII столітті**. Зараз кулан знову живе в Україні в напіввільному стані в заповіднику Асканія-Нова та на острові Бирючий у Приазов'ї.

Тур, або первісний бик (Bos primigenius), — це **вимерлий вид диких биків**, який був пращуром свійського бика. Тури жили в Європі, Центральній і Південно-західній Азії та Північній Африці, мешкаючи в лісах, лісостепах і степах. **Європейський тур (Bos primigenius primigenius Vojanus)** був предком свійського бика і населяв степи, лісостеги та мішані ліси України, де на нього полювали. Останній тур загинув у Якторовській Пущі на Мазовії **в 1627 році**.



Сайгак степовий (Saiga tatarica), — це ссавець з родини бикових, який належить до групи антилоп. Сайгаки живуть у степах і колись широко населяли Європу та Азію, але зараз їх можна знайти лише в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та на заході Монголії. Останнього сайгака в Україні **забили у 1898 році** біля села Преображенка. Зараз сайгаків реінтродуковано в заповіднику Асканія-Нова.

ВИДИ ТВАРИН, ЩО ЗНИКЛИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

хоча раніше були поширеними тут

ВИДАВНИЦТВО
РАНОК



Стерв'ятник (Neophron percnopterus) — це хижий птах з родини яструбових і єдиний представник свого роду. Він живе в південних країнах Європи, Азії та Північної Африки. Ще кілька десятків років тому вони гніздилися поодинокими парами в скелястих урвищах вздовж берегів Дністра та в горах Криму. Останнє гніздування було помічене **в Криму у 1958 році**, і тепер же зрідка трапляються бродяжні птахи.

Чайка степова (Vanellus gregarius) — це вид птахів родини сивкових (Charadriidae). Вона має розмір, як у звичайної чайки, але виглядає стрункішою. Здалеку чайка степова здається сірою, але в неї чорне тім'я і черево. Ці птахи живуть у степах Північно-Західної Азії. **В Україні** ці птахи **гніздилися в середині XIX століття** на Донеччині та Полтавщині. **До середини XX століття** їх можна було побачити **під час перельотів у південних регіонах**.



Орел степовий (Aquila nipalensis) — це хижий птах з родини яструбових, який є **рідкісним видом в Україні**. Він живе переважно в степах, на рівнинах або горбистих територіях, а також у напівпустелях, околицях пустель та великих рівнинах у горах. В Євразії він поширений у степовій зоні. **В Україні до 1980-х років він гніздився в заповіднику Асканія-Нова**. Зараз іноді можна побачити бродячих птахів.

ВИДИ РОСЛИН, ЩО ЗНИКЛИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

хоча раніше були поширеними тут

ВИДАВНИЦТВО
РАНОК



Гвоздика гренобльська (Dianthus gratianopolitanus Vill.) - рослина родини Гвоздикових. Була поширена в Чернівецькій області (Заставнівський район, околиці села Хрещатик.) Росла на правому березі річки Дністер. Можливими причинами зникнення є **зменшення відкритих територій через заліснення схилів та низька конкурентоспроможність.**

Дрік малонасінний Genista oligosperma (Andrae) Simonk - рослина родини Бобових. Була поширена в Закарпатській області (Рахівський район). Ймовірно, популяції є малочисельними та знаходяться у важкодоступних місцях, тому вони залишаються поза увагою дослідників. **Протягом останніх майже 100 років їх не збирали.**



Ломикамінь супротивнолистий (Saxifraga oppositifolia L.) - рослина родини Ломикаменеві. Була поширена в Івано-Франківській області (урочище Кізі Улоги, на скелях г. Бребенескул). Цей вид не знаходили з 1933 року. **Вважається, що він зник через інтенсивне випасання до введення заповідного режиму.**

ВИДИ РОСЛИН, ЩО ЗНИКЛИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

хоча раніше були поширеними тут

ВИДАВНИЦТВО
РАНОК



Людвігія болотна (Ludwigia palustris (L.) Elliott) - рослина родини Онагрових. Була поширена в Закарпатській області. Через слабку конкурентоспроможність – зростала лише на майже незарослих мулистих субстратах. Страждала **від різких змін гідрологічного режиму водойм і боліт**, особливо через осушення.

Первоцвіт борошнистий (Primula farinosa L.) - рослина родини Первоцвітних. Була поширена в Закарпатській області. Можливими причинами зникнення є **меліорація, порушення водного режиму**, скасування тимчасового статусу заказника місцевого значення на територіях де його знаходили. Останній раз **був знайдений в 1961 році**.



Плаунчик швейцарський (Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze) - рослина родини Плаункових. Була поширена в Закарпатській області (Виноградівський район). Зростав в Українських Карпатах, на північному схилі Вигорлат-Гутинського хребта на лівому березі річки Тиса біля села Веряця. **Вважається, що зник через антропогенний фактор**. Точні причини зникнення невідомі.

ВИДИ РОСЛИН, ЩО ЗНИКЛИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


хоча раніше були поширеними тут

ВИДАВНИЦТВО
РАНОК



Плетуха сольданелова (Calystegia soldanella (L.)) - рослина родини Берізкові. Була поширена в Криму. Зростала на Південному березі Криму від Севастополя до Судака. Вважається, **що зникла через наростання рекреаційного навантаження, створення берегозахисних споруджень**. Останні знахідки представників даного виду датуються в 1980-х рр.

Пухирник Брема (Utricularia bremii) - рослина родини Пухирникових. Була поширена в Закарпатській області (в болоті Чорний Мочар між містами Мукачево та Берегово). Єдина популяція була втрачена в 1950-1960-х роках **через осушення всіх боліт та вологих територій** у районі Чорного Мочара та їх перетворення на сільськогосподарські угіддя.



Шильник водяний (Subularia aquatica L.) - рослина родини Капустяні. Була поширена в Вінницькій (біля міста Могилів-Подільський) та Дніпропетровській області (по річці Вовчій). Сучасні дослідження не підтвердили місцеперебування даного виду на цих територіях. **Вважається, що зник через антропогенний фактор.**